

Risolvere equazioni polinomiali di grado superiore al secondo

Risolvere equazioni 'per tentativi'

Un primo esempio di equazione polinomiale di 3° grado

$$x^3 - 3x^2 - x + 3 = 0$$

Coefficienti tutti interi: $a_3 = 1$, $a_2 = -3$, $a_1 = -1$, $a_0 = 3$.

Cerco possibili soluzioni intere fra i divisori di 3, che sono:

1, -1, 3, -3

- Sostituisco **1** ad x ; ottengo $1 - 3 - 1 + 3 = 0$ e trovo $x_1 = 1$
- Sostituisco **-1** ad x ; ottengo $-1 - 3 + 1 + 3 = 0$ e trovo $x_2 = -1$
- Sostituisco **3** ad x ; ottengo $27 - 27 - 3 + 3 = 0$ e trovo $x_3 = 3$

L'equazione di 3° grado e non può avere più di 3 soluzioni reali; così ho trovato le 3 soluzioni.

Non sempre i tentativi sono fortunati

Un secondo esempio di equazione polinomiale di 3° grado

$$x^3 - x^2 - 3x + 3 = 0$$

Coefficienti tutti interi: $a_3 = 1$, $a_2 = -1$, $a_1 = -3$, $a_0 = 3$

Cerco possibili soluzioni intere fra i divisori di 3, che sono:

1, -1, 3, -3

- Sostituisco **1** ad x ; ottengo $1 - 1 - 3 + 3 = 0$ e trovo $x_1 = 1$
- Sostituisco **-1** ad x ; ottengo $-1 - 1 - 3 + 3 = -2$;
- Sostituisco **3** ad x ; ottengo $27 - 9 - 9 + 3 = 12$;
- Sostituisco **-3** ad x ; ottengo $-27 - 9 + 9 + 3 = -24$.

Così ho trovato una sola soluzione. Come procedo per cercare le altre due soluzioni?

La divisione di due polinomi

Ho trovato che ha la soluzione $x_1 = 1$ l'equazione

$$x^3 - x^2 - 3x + 3 = 0$$

Perciò posso scrivere

$$x^3 - x^2 - 3x + 3 = (x - 1)(\dots\dots\dots)$$

Come ottenere il polinomio da scrivere nella parentesi?

Ricordo una scrittura analoga con i numeri interi:

$$6 = 2 \times \dots$$

Otengo il numero da scrivere sui puntini con la divisione

$$6 : 2 = 3$$

E così, per avere il polinomio da scrivere nella parentesi, dovrò eseguire la divisione

$$(x^3 - x^2 - 3x + 3) : (x - 1)$$

Come si dividono
due polinomi?

Procedimento per dividere due polinomi

$$\begin{array}{r|l} \boxed{x^3} - x^2 - 3x + 3 & x - 1 \\ - (x^3 + x^2) & x^2 - 3 \\ \hline & -3x + 3 \\ & \boxed{-3x} + 3 \\ & - (-3x + 3) \\ \hline & 0 \end{array}$$

a. Divisione $\boxed{x^3} : x = x^2$

b. Moltiplicazione

$$x^2 (x - 1) = x^3 - x^2$$

c. Sottrazione

$$x^3 - x^2 - 3x + 3$$

$$- (x^3 - x^2) = -3x + 3$$

Ripeto i tre passi

a₁. $\boxed{-3x} : x = -3$

b₁. $-3(x - 1) = -3x + 3$

c₁. $-3x + 3 - (-3x + 3) = 0$

$$\boxed{x^3 - x^2 - 3x + 3 = (x - 1)(x^2 - 3)}$$

Tutte le soluzioni del secondo esempio

Equazione data:

$$x^3 - x^2 - 3x + 3 = 0$$

Soluzione trovata per tentativi:

$$x_1 = 1$$

Con la divisione di polinomi trovo:

$$x^3 - x^2 - 3x + 3 = (x - 1)(x^2 - 3)$$

Invece dell'equazione data, risolvo l'equazione seguente:

$$(x-1)(x^2-3)=0 \Rightarrow \begin{cases} x-1=0 \Rightarrow x_1=1 \\ x^2-3=0 \Rightarrow x^2=3 \Rightarrow \begin{cases} x_2=-\sqrt{3} \\ x_3=\sqrt{3} \end{cases} \end{cases}$$

Procedimento per risolvere equazioni polinomiali di grado superiore al secondo

Gli esempi delineano un procedimento articolato in due passi:

- 1. Scrivere il polinomio al primo membro come prodotto di polinomi di 1° o 2° grado.**
- 2. Applicare la legge di annullamento del prodotto.**

Scomporre polinomi in fattori

Il primo passo, cioè ‘scrivere un polinomio come prodotto di polinomi’, si sintetizza con la frase ‘*scomporre un polinomio in fattori*’ o ‘*fattorizzare un polinomio*’ e presenta molte analogie con la scomposizione in fattori di un numero naturale.

Numeri naturali	Polinomi
Numero scomposto in fattori $6 = 2 \times 3$	Polinomio scomposto in fattori $x^3 - x^2 - 3x + 3 = (x - 1)(x^2 - 3)$
6 è divisibile per 2	$x^3 - x^2 - 3x + 3$ è divisibile per $(x - 1)$
$30 = 2 \times 3 \times 5$ è divisibile per 2 e per 3, perciò è divisibile per $2 \times 3 = 6$	$x^3 - 3x^2 - x + 3 = (x - 1)(x + 1)(x - 3)$ è divisibile per $(x - 1)$ e per $(x + 1)$, perciò è divisibile per $(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$

Attività

Completa la scheda di lavoro per risolvere varie equazioni polinomiali

Cosa hai trovato?

Soluzioni di un'equazione 'per tentativi'

1. Completa la risoluzione della seguente equazione

$$2x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 2x + 1 = 0$$

Il polinomio P al primo membro è di 4° grado, perciò l'equazione può avere 4 soluzioni reali.

A. cerco le soluzioni per tentativi: il termine noto 1 ha come divisori: 1 e -1

- sostituisco 1 ad x e ottengo $2 - 2 - 3 + 2 + 1 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$ è soluzione

- sostituisco -1 ad x e ottengo $2 + 2 - 3 - 2 + 1 = 0 \Rightarrow x_2 = -1$ è soluzione

Ricorda: una soluzione di un'equazione è un numero che, sostituito all'incognita (x) trasforma l'equazione in un'uguaglianza vera

Soluzioni di un'equazione 'per tentativi'

1. Completa la risoluzione della seguente equazione

$$2x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 2x + 1 = 0$$

B. Per cercare altre soluzioni scompongo il polinomio P in fattori.

-1 è soluzione dell'equazione



P è divisibile per $(x + 1)$

1 è soluzione dell'equazione



P è divisibile per $(x - 1)$



P è divisibile per $(x + 1)(x - 1) = x^2 - 1$

Divisione di polinomi

Eseguo la divisione $(2x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 2x + 1) : (x^2 - 1)$

$$\begin{array}{r|l} 2x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 2x + 1 & x^2 - 1 \\ -(2x^4 - 2x^2) & 2x^2 - 2x - 1 \\ \hline -2x^3 - x^2 + 2x + 1 & \\ -(-2x^3 + 2x) & \\ \hline -x^2 + 1 & \\ -(-x^2 + 1) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Passi da seguire

a. *Divisione* $2x^4 : x^2 = 2x^2$

b. *Moltiplicazione* $2x^2(x^2 - 1) = 2x^4 - 2x^2$

c. *Sottrazione*

$$2x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 2x + 1 - (2x^4 - 2x^2) = 2x^3 - x^2 + 2x + 1$$

Ripeti i primi 3 passi

a₁. $-2x^3 : x^2 = -2x$

b₁. $-2x(x^2 - 1) = -2x^3 + 2x$

c₁. $-2x^3 - x^2 + 2x + 1 - (-2x^3 + 2x) = -x^2 + 1$

Ripeti i primi 3 passi

a₂. $-x^2 : x^2 = -1$

b₂. $-1(x^2 - 1) = -x^2 + 1$

c₂. $-x^2 + 1 - (-x^2 + 1) = 0$

$$2x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 2x + 1 = (x^2 - 1)(2x^2 - 2x - 1)$$

Risolve l'equazione con il principio dell'annullamento del prodotto

$$(x^2 - 1)(2x^2 - 2x - 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 1 \end{cases} \\ 2x^2 - 2x - 1 = 0 \\ \Delta = (-2)^2 + 8 = 12 \Rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{4} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = \frac{2 - \sqrt{12}}{4} \\ x_4 = \frac{2 + \sqrt{12}}{4} \end{cases} \end{cases}$$

Riflessioni sulla divisione di polinomi

Ordinare polinomi secondo le potenze decrescenti di x

2. *Spiega perché le seguenti due divisioni conducono al procedimento seguito nel quesito 1.*

$$(2x + 1 + 2x^4 - 2x^3 - 3x^2) : (-1 + x^2)$$

$$(-2x^3 - 3x^2 + 2x + 1 + 2x^4) : (-1 + x^2)$$

Ordino i due polinomi secondo le potenze decrescenti di x e ottengo tutte e due le divisioni scritte nella forma

$$(2x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 2x + 1) : (x^2 - 1)$$

Riflessioni sulla divisione di polinomi

Rivedere la divisione di monomi

3. *Esegui le divisioni qui sotto.*

$$x^4 : x = x^3$$

$$(6x^5) : (2x^3) = 3x^2$$

$$(3x^4) : (2x^3) = \frac{3}{2}x$$

$$(-6x^2) : (2x^2) = -3$$

$$(ax^n) : (bx^m) = \frac{a}{b}x^{n-m} \text{ (con } n \geq m, a \text{ e } b \text{ interi)}$$

Riflessioni sulla divisione di polinomi

Rivedere la sottrazione di monomi

4. Esegui le sottrazioni di polinomi qui sotto

$$\begin{aligned} 2x^4 + 2x + 1 - (2x^3 - x^2) &= \\ = 2x^4 + 2x + 1 - 2x^3 + x^2 &= 2x^4 - 2x^3 + x^2 + 2x + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x^5 - x^3 + 3x - (2x^3 - x^2 + 3x) &= \\ = 3x^5 - \cancel{x^3} + \cancel{3x} - 2x^3 + x^2 - \cancel{3x} &= 3x^5 - 3x^3 + x^2 \end{aligned}$$

Monomi simili

Riflessioni sulla divisione di polinomi

Il procedimento per dividere due polinomi presenta molte analogie con quello per dividere **due numeri naturali**.

$$\begin{array}{r|l}
 2x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 2x + 1 & x^2 - 1 \\
 -(2x^4 - 2x^2) & 2x^2 - 2x - 1 \\
 \hline
 -2x^3 - x^2 + 2x + 1 & \\
 -(-2x^3 + 2x) & \\
 \hline
 -x^2 + 1 & \\
 -(-x^2 + 1) & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l}
 672 & 21 \\
 -63 & 32 \\
 \hline
 42 & \\
 -42 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

$$672 = 21 \times 32$$

$$2x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 2x + 1 = (x^2 - 1)(2x^2 - 2x - 1)$$

Riflessioni sulla divisione di polinomi

Divisione con resto fra numeri naturali

A long division problem showing 686 divided by 21. The divisor 21 is written on the right, and the dividend 686 is on the left. The quotient 32 is written above the dividend. The first step shows 21 multiplied by 3 (63) subtracted from 68, leaving a remainder of 5. The second step shows 21 multiplied by 2 (42) subtracted from 56, leaving a remainder of 14. The remainder 14 is highlighted in a light blue box. A blue arrow points from a box labeled 'Divisore 21' to the divisor 21. An orange arrow points from a box labeled 'Resto 14 < 21' to the remainder 14.

$$\begin{array}{r} 686 \quad | \quad 21 \\ -63 \quad | \quad 32 \\ \hline 56 \\ -42 \\ \hline 14 \end{array}$$

Resto
 $14 < 21$

Divisore
21

$$686 = 21 \times 32 + 14$$

Riflessioni sulla divisione di polinomi

Divisione con resto fra polinomi

$$\begin{array}{r|l} 2x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 5 & x^2 - 1 \\ - (2x^4 - 2x^2) & 2x^2 - 2x - 1 \\ \hline - 2x^3 - x^2 + 4x + 5 & \\ - (-2x^3 + 2x) & \\ \hline - x^2 + 2x + 5 & \\ - (-x^2 + 1) & \\ \hline 2x + 4 & \end{array}$$

Resto
 $2x + 4$
di grado
 $1 < 2$

Divisore
 $x^2 - 1$
di grado 2

$$2x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 5 = (x^2 - 1)(2x^2 - 2x - 1) + 2x + 4$$

Altri metodi per scomporre in fattori polinomi

Equazione biquadratica del tipo $ax^4 + bx^2 + c = 0$

5. È data la seguente equazione

$$x^4 - 5x^2 + 6 = 0$$

Osservo che $x^4 - 5x^2 + 6 = (x^2)^2 - 5x^2 + 6$

Perciò scelgo l'incognita ausiliaria $t = x^2 \Rightarrow t^2 = x^4$

Risolverò l'equazione $t^2 - 5t + 6 = 0$

Se $ax^2 + bx + c = 0$ ha le soluzioni reali x_1 e x_2 , scrivo

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

- Calcolo $\Delta = (-5)^2 - 24 = 25 - 24 = 1$ e $t = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} \Rightarrow \begin{cases} t_1 = \frac{5-1}{2} = 2 \\ t_2 = \frac{5+1}{2} = 3 \end{cases}$

- Scompongo in fattori $t^2 - 5t + 6 = (t - 2)(t - 3)$

- Torno all'incognita x e risolvo l'equazione con il principio di annullamento del prodotto

$$(x^2 - 2)(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\sqrt{2} \\ x_2 = \sqrt{2} \end{cases} \\ x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 3 \Rightarrow \begin{cases} x_3 = -\sqrt{3} \\ x_4 = \sqrt{3} \end{cases} \end{cases}$$

Altri metodi per scomporre in fattori polinomi

Applicare i prodotti notevoli

$$x^4 - 9 = 0 \Rightarrow (x^2 - 3)(x^2 + 3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 3 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\sqrt{3} \\ x_2 = \sqrt{3} \end{cases} \\ x^2 + 3 = 0 \Rightarrow x^2 = -3 \Rightarrow \text{nessuna soluzione reale} \end{cases}$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

con

$$a^2 = x^4 \Rightarrow a = x^2$$

$$b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$$

Altri metodi per scomporre in fattori polinomi

Applicare i prodotti notevoli

$$x^4 - 8x^2 + 16 = 0 \Rightarrow (x^2 - 4)^2 = 0 \Rightarrow (x^2 - 4) = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \text{ ripetuta due volte} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 = -2 \\ x_3 = x_4 = 2 \end{cases}$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

con

$$a^2 = x^4 \Rightarrow a = x^2$$

$$b^2 = 16 \Rightarrow b = 4$$

Altri metodi per scomporre in fattori polinomi

Applicare i prodotti notevoli

$$x^3 - 12x^2 + 6x - 8 = 0 \Rightarrow (x-2)^3 = 0 \Rightarrow x-2=0 \Rightarrow x=2 \text{ ripetuta tre volte} \Rightarrow x_1 = x_2 = x_3 = 2$$

$$a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a-b)^3$$

con

$$a^3 = x^3 \Rightarrow a = x$$

$$b^3 = 8 \Rightarrow b = 2$$

Altri metodi per scomporre in fattori polinomi

Applicare i prodotti notevoli

$$x^3 - 8 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x^2 + 2x + 4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x - 2 = 0 \Rightarrow x_1 = 2 \\ x^2 + 2x + 4 = 0 \Rightarrow \text{nessuna soluzione reale} \\ \Delta = (-2)^2 - 16 = -4 < 0 \end{cases}$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

con

$$a^3 = x^3 \Rightarrow a = x$$

$$b^3 = 8 \Rightarrow b = 2$$

Altri metodi per scomporre in fattori polinomi

Raccogliere anche un fattore comune

$$\frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{4}x^2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{4}x^2(x^2 - 5) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{4}x^2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = 0 \\ x^2 - 5 = 0 \Rightarrow x^2 = 5 \Rightarrow \begin{cases} x_3 = -\sqrt{5} \\ x_4 = \sqrt{5} \end{cases} \end{cases}$$

$$x^4 - 12x^3 + 6x^2 - 8x = 0$$

$\Downarrow$


$$x(x^3 - 12x^2 + 6x - 8) = 0 \Rightarrow x(x - 2)^3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \\ (x - 2)^3 = 0 \Rightarrow x_2 = x_3 = x_4 = 2 \end{cases}$$

Studi antichi e attuali per risolvere equazioni

Il metodo di fattorizzare il polinomio permette di risolvere equazioni polinomiali solo in pochi casi, per questo numerosi e approfonditi sono stati gli studi per risolvere un'equazione.

Ecco qualche idea su questi studi.

Soluzioni esatte e soluzioni approssimate



Equazione $\frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{4}x^2 = 0$

$\sqrt{5}$ soluzione esatta

$$\frac{1}{4}(\sqrt{5})^4 - \frac{5}{4}(\sqrt{5})^2 = 0$$

2,2 soluzione approssimata

$$\frac{1}{4}(2,2)^4 - \frac{5}{4}(2,2)^2 = -0,1936$$

Numero vicino a 0


Questo metodo grafico è oggi realizzato da un computer con un idoneo software.

Uno sguardo alla storia

Metodi algebrici per risolvere equazioni in modo approssimato hanno origini antiche: a partire dal 1200 fino a un notevole sviluppo nel corso del 1700 e alle attuali applicazioni, basate sull'uso di opportuni software (CAS)



Fibonacci
1170 - 1240



Isaac Newton
1642 - 1727



Stephen Wolfram
1959

Uno sguardo al CAS di Geogebra

The screenshot displays the Geogebra CAS interface. At the top, a toolbar contains various mathematical symbols and functions. Below the toolbar, the interface is split into two main panels: 'Vista CAS' (CAS View) on the left and 'Vista Grafica' (Graphics View) on the right.

In the 'Vista CAS' panel, the following steps are shown:

- Input: $g:=y=0.5x^5 - x^3 - x^2 + 1$
- Transformation: $\rightarrow g: y = \frac{x^5 - 2x^3 - 2x^2 + 2}{2}$
- Equation: $0.5x^5 - x^3 - x^2 + 1 = 0$
- Simplified equation: $\frac{x^5 - 2x^3 - 2x^2 + 2}{2} = 0$
- Solution: $\{x = -1.2131, x = 0.8047, x = 1.6637\}$

In the 'Vista Grafica' panel, a graph of the polynomial function is shown. The x-axis ranges from -2 to 2, and the y-axis ranges from -1 to 1. The curve crosses the x-axis at three points, labeled x_1 , x_2 , and x_3 , which correspond to the approximate solutions found in the CAS view.

Annotations and arrows:

- A red box labeled "Barra degli strumenti CAS" points to the CAS toolbar.
- A blue box labeled "Grafico del polinomio" points to the graph in the 'Vista Grafica' panel.
- A yellow box labeled "Soluzioni *approssimate* dell'equazione" points to the solution set in the 'Vista CAS' panel.